

मुद्दे:

- * ह्या रोगांत पाना वयर वा सकल कवळतात तशेंच पाना बारीक जातात.



- * थ्रिप्स (फुलकीडी), एफिड तशेंच मायट (कोळी) सारख्या किडी लागून हो रोग पसरता.
- * ह्यो किडी पानांतले रोस शोषून घेतात देखून पाना कवळतात. व्हायट फ्लाय हि किड मुठ्या रोगाच्या प्रसाराक कारणीभूत आसता.

उपाय

- * सरभवताणे वाढतले तण वा हेर पर्यायी झाडा ना करची (नडची)
- * मुठ्ये आसिल्ली दर एक पाना काढून उडवचें.
- * चढ मुठ्ये जाल्ली झाडा उपटयात आनी जाळची.
- * लागवड केल्या उपरांत १० दिवसांनी कार्बोफुरोन (३G) ३ किलो दर १००० चौखण शेता खातिर वापरचें.
- * त्या उपरांत इमिडाक्लोप्रिड ३.० मिली / १० लीटर उदकांत वा रोगोर १.५ मिली / लीटर हांचे २ ते ३ फवारणी करची.
- निम युक्त किडनाशकाची (अझारडीरेक्टीन २-३ मिली / लीटर) ७ ते १० दिसा फरकांन फवारणी करुन हो रोग आडावपाक येता. निळी तशेंच पिवळी पट्टी आशिल्ले स्टिकर पांजरो म्हणोन वापरचें. सरभवताणी रोजांची (झेंडू) झाडा पांजरो वा आडावण म्हणोन रोवपाची.

फळ किडी:

- * पुराय वाढिली ही किड मिरसांगेची फळा तोपतात.
- * सूर्वेक हि किड पानार वाडता मागीर ती फळाक नुकसान करता.



उपाय:

- * इबाडलेली फळा एकटाय करुन नष्ट करात.
- * दरेकी १००० चौखण मिटर जमिनीत २ फिरमोन पांजरे वापरतात.

- * कार्बारील ५० wp @ २ ग्रॅम प्रति लिटर वा डायक्लोरवॉस @ १ मिली प्रति लिटर प्रमाण फवारणी करात.
- * १० दिसा उपरांत परत फवारणी करात.
- * रासायनीक ओकदांच्या जाग्यार जैविक ओकदा देखीक बेसिलस थुरीनजियन्सिस / NPV ही सांजेची वारप चड बरे.

अधीक माहितीखातीर आणी सरकारच्या यवजणेखातीर लागच्या विभागीय शेती कार्यालयात भेट दिवची

विभागीय शेती कार्यालय - तिसवाडी
(०८३२) २२८५३२९

विभागीय शेती कार्यालय - सांगे
(०८३२) २६०४२५३

विभागीय शेती कार्यालय - फोंडा
(०८३२) २३१२११९

विभागीय शेती कार्यालय - काणकोण
(०८३२) २६४३०६६

विभागीय शेती कार्यालय - केपें
(०८३२) २६६२११६

विभागीय शेती कार्यालय - सन्तरी
(०८३२) २३७४२४६

विभागीय शेती कार्यालय - म्हापसा
(०८३२) २२६२३६८

विभागीय शेती कार्यालय - दिवचल
(०८३२) २३६२१२८

विभागीय शेती कार्यालय - मडगांव
(०८३२) २७१५००५

विभागीय शेती कार्यालय - धारबांदोडा
(०८३२) २३४४५००


विभागीय शेती कार्यालय - पेडणे
(०८३२) २२०१२९१

मिरसांगेची लागवड



STATE MISSION DIRECTOR
NATIONAL HORTICULTURE MISSION

Krishi Bhavan, Tonca, Cranzalem, Goa 403001
Ph. 0832-2465440, 2465443, 2465845



मिरसांगेची लागवड

माती:

- * मिरसांगेची लागवड रेवट ते चिकण मातयेत खयंय बऱ्या बशेन करू शकतात.
- * साधारणपणान उदकाचो निचरो बरो जावपी, बरे उदक सांभाळपी, हलकी पूण सूपीक जमीन मिरसांगेक मानवता.

जाती:

- * गावठी: खोला, हळदोणा
- * सुधारित: कोंकण कीर्ती, काशी अनमोल (KA-2)
- * संकरीत: निशा २१२, आर्का मेघना

बेयावण:

- * गावठी तशेंच सुधारित जातीच्यो ७० ते ८० ग्रॅम बियो दर १००० चौखण जमिनीखातीर. जाल्यार संकरीत जातीच्यो ३५ ते ४० ग्रॅम बियो १००० चौखण जमिनीखातीर वापरचें.

प्रक्रिया:

- * दर एके किलो बियांक थायरम वा कॅप्टन हे बुरशीनाशक २ ते ३ ग्रॅम चोळचे.

खांदळा / आयना:

- * खांदळा खासा करुन उकत्या सुवातीचेर करची.
- * सुर्वेक माती खणची, माती मेकळी करुन घेवन तांततले फातर वा हेर कोचोप काडचो.
- * त्याउपरांत बरे कुसलेले शेणखत वा कंपोस्ट आनी त्याबरोबर नीम पेडीचो पावडर दर चौखण मिटराक शंभर ग्रॅम वापरचे. रेव वा कस वापरल्यार जाता.
- * तयार जाल्ली जमिन दोन ते तीन दीस मेकळी दवरची.
- * उपरांत १ मीटर रुंदायच्यो तशेंच १० ते १५ सें. मी. उंचायच्यो आनी जायत्या लांबायची माचवे तयार करात.
- * बिया रोवच्या काय वरा आदी माचव्याचेर उदक शिंपात.
- * दर ५ सें. मी. फरकान सुमार खोलायेच्यो चरी बडयेन मारात.
- * ह्या चरयेत बियो घालून, त्यो चरयो मातीन भरात.
- * बियो पातळ घालात, चड दाटसाणेन बियो रोवप टाळात.
- * खांदळा शिंपपाक झारीचो वापर करात.



शीटकावणी:

- * किल्लोन येतापर्यंत खांदळा दर दिसा दोन वेळा शिंपा उपरांत दर दिसा एकदाच शिंपा. किल्लत्या उपरांत तण वा चुडता घातील्ली ती काडात.
- * मुया पासून सादूर रावात, मुये जायते फावट बियो व्हरतात वा इबाडतात.
- * त्या पासत क्लोरपायरीफॉस (१ मिली / लीटर) हांची फवारणी करात.

मुखेल लागवड:

मशागत

- * जमिन कसून घेयात आनी समतळार हाडात.
- * त्या उपरांत बरें कुसलेले शेणखत, कंपोस्ट वा गांयडोळ माती दर १००० चौखण मीटर जागेखातीर २ टन ह्या प्रमाणात वापरची.
- * शिंपणावळ उपलब्ध आशिल्या जमिखतीर चरो मारच्यो.



रोपा काढप

- * ४ ते ५ आठपड्या उपरांत जेन्हा रोपा १२ ते १५ सें मी. उंच तशेंच ४ ते ५ पाना आशिल्ली जातात तेन्हा ती मूळ शेतात लागवडी योग्य जाल्ली आसतात.

खांदळा उदक शिंपून भिजोवन घेवची

रोपा हुमटयताना लहवसर आनी मुळा दुखयनासताना हुमटायची. रोपयो पंधरा मिनीटा ट्रायकोडरमा विरडी (१५ ग्रॅम / लीटर) ह्या द्रावणात बुडवच्यो, ज्याचेवरवे रोपयो, खुपशा जमनीनसावन येवपी दुयेसासावन वाटायतली उपरांत रोकडेच रोपयो मूळ शेतात रोवच्यो आनी शिंपणावळ दिवची.

लागवड : (चरो तशेंच रोपया मदले अंतर)

मोटव्यो जाती : ४५ X ३० सें मी

सुमार जाती : ६० X ४५ सें मी

उंच तशेंच संकरीत जाती : ७५ X ६० सें मी

साऱें: (दर १००० चौखण मिटरा खातीर)

जुस्त सारीं वापरल्यार मिरसांग बऱ्यें उत्पन्न दिता.

गांवठी तशेंच सुधारित जाती खातीर:

- * लागवडीवेळार १५ कि. DAP (डिएपी) १० कि. MOP (पॉटेश) दिवचे.

- * तीन आठवड्या उपरांत ९ कि. युरिया दिवचें.
- * जाल्यार स आठवड्या उपरांत ९ कि. युरिया दिवचें.

संकरीत जाती खातीर:

- * लागवडीवेळार १७ कि. DAP (डिएपी) आनी १२ कि. MOP (पॉटेश) दिवचे.
- * एका म्हयन्या उपरांत ९ कि. युरिया दिवचें.
- * दोन म्हयन्या उपरांत ९ कि. युरिया दिवचें.
- * तीन म्हयन्या उपरांत ९ कि. युरिया दिवचें.

शिंपणावळ आनी हेर देखरेख:

- * नियमित शिंपप गरजेचे आसात, गिमांत २ ते ३ दिसान शिंपप करपाकच जाय.
- * जमिनीची समतल ओलसण फुलां आनी फळां धारणेक खूप गरजेची आसता.
- * लागवडी उपरांत ३० दिसान माती मोडून, भराव घालचो.

तण व्यवस्थापन:

नियमित नडणी काडून शेत, नितळ दवरांत नडणेचो खर्च कमी करपाक यंत्रिकीकरण करात, तशेंच खोलयो वा तणान जमिन धापून घेयात.

येणावळ:

- * पयली काढणी सुमार ७० दिसा उपरांत मेळता.
- * मिरसांगेची लांबाय १२-१५ सें मी जातकीच मीरसांग काडच्यायोग्य जाता.
- * पाचव्या रंगाच्यो मिरसांगोच फक्त काडच्यो.

रोग आनी किडी

रोप कुसप

- * मुळाव्या जाग्यार कुसील्यान झाड बावता.
- * रोप वाटीकेत खांदळात दोन चऱ्या मदी उण्यात ५ सें मी जागो सोडचो.
- * बरे कुसलेल्यार शेणखती बरोबर जैविक ओकदा जशी ट्रायकोडरमा पावडर वापरची.
- * बि रोयताना बियांक थायरम व कॅप्टन ३ ग्रॅम प्रती किलो चोळचें.
- * रोगट रोपयो काडून उडोवचें.
- * जाय तितल्याच उदकाचो वापर करचो, उदक साठोवपाक दिवचे न्हय.

